




## A RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LE NOMBRE DE JOURS AVEC MIGRAINE PAR MOIS

COMPARATIVEMENT AU PLACEBO CHEZ DES PATIENTS AUX PRISES AVEC UNE MIGRAINE CHRONIQUE

(Paramètre principal : réduction du nombre moyen de JMM par rapport aux valeurs initiales; Vyepti<sup>MD</sup> -7,7; placebo -5,6,  $p < 0,0001$ ; différence par rapport au placebo = -2; IC<sub>95%</sub> [-2,9 à -1,2]<sup>1,2</sup>)

Pr VYEPTI<sup>MD</sup> (eptinézumab pour injection) est indiqué pour la prévention de la migraine chez l'adulte ayant au moins 4 jours avec migraine par mois. Vyepti<sup>MD</sup> doit être prescrit par un professionnel de la santé ayant de l'expérience dans le diagnostic et le traitement de la migraine.



UNE PERFUSION I.V.  
DE 30 MINUTES TOUTES  
LES 12 SEMAINES

coordonnée par **Aujourd'hui**  
Programme de soutien aux patients

Migraine chronique —  
essai PROMISE-2\*  
Vyepti<sup>MD</sup> 100 mg, semaines 1 à 12

**Réduction**  
du nombre moyen de JMM par  
rapport aux valeurs initiales

↓ **-7,7** vs ↓ **-5,6**  
JMM JMM

**48 % de réduction** sous Vyepti<sup>MD</sup> (n = 356)    **35 % de réduction** sous placebo (n = 366)

(paramètre principal;  $p < 0,0001$ ; différence par rapport au placebo = -2; IC<sub>95%</sub> [-2,9 à -1,2]<sup>1,2</sup>)

Au départ, la fréquence moyenne était de 16,1 JMM et était comparable dans tous les groupes.

Migraine chronique — essai PROMISE-2\*  
Vyepti<sup>MD</sup> 100 mg, semaines 1 à 12  
Taux de répondeurs  $\geq 75\%$  (JMM<sup>†</sup>)

**Une réduction  $\geq 75\%$**   
**du nombre de JMM**  
par rapport aux valeurs initiales

a été obtenue  
chez **27 %** vs chez **15 %**  
des patients sous Vyepti<sup>MD</sup> (n = 356)    des patients sous placebo (n = 366)

(paramètre secondaire majeur;  $p = 0,0001$ ; différence par rapport au placebo = 11 %)<sup>1,2</sup>.

<sup>†</sup> Proportion de patients chez qui le nombre de JMM a diminué de 75 % ou plus pendant la période précisée, par rapport aux valeurs initiales.

JMM = jours avec migraine par mois

\* Essai mondial mené à double insu avec placebo sur des groupes parallèles, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de Vyepti<sup>MD</sup> pour le traitement préventif de la migraine chronique (définie par  $\geq 15$  à  $\leq 26$  jours avec céphalée, dont  $\geq 8$  jours avec migraine) chez l'adulte. Au total, 1072 patients ont été randomisés de façon à recevoir un placebo (n = 366), 100 mg d'eptinézumab (n = 356) ou 300 mg d'eptinézumab (n = 350) toutes les 12 semaines pendant 24 semaines (2 perfusions). Le paramètre principal était la variation du nombre moyen de JMM au cours des semaines 1 à 12 par rapport aux valeurs initiales. Les paramètres secondaires majeurs étaient le pourcentage de répondeurs chez qui le nombre de JMM avait diminué de  $\geq 75\%$  des semaines 1 à 12.

**eptinézumab pour injection**  
100 mg/mL

Formé d'infirmières, de pharmaciens et de spécialistes en remboursement, le Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI<sup>MC</sup> aide les patients à qui vous avez prescrit Vyepti<sup>MD</sup> et coordonne leurs perfusions.



#### Centre d'assistance + équipe de soins attirée

- Un seul point de service pour le patient
- Soutien d'une équipe de professionnels : infirmière, pharmacien et spécialiste en remboursement



#### Soutien à l'instauration du traitement

- Accès plus facile et plus rapide du patient à son traitement
- Repérage de la clinique de perfusion la plus proche



#### Appui financier et aide pour le remboursement

- Moins de formalités administratives pour votre clinique
- Accompagnement du patient à chacune des étapes du remboursement



#### Soins durant la perfusion et coordination des rendez-vous

- Conseils de la part d'infirmières tout au long de la perfusion de Vyepti<sup>MD</sup>
- Coordination de rendez-vous



#### Soutien continu

- Accompagnement du patient tout au long du traitement
- Possibilité de soutien personnalisé par téléphone et par courriel

**Inscrivez vos patients au Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI<sup>MC</sup>**  
Communiquez avec nous pour instaurer le traitement de vos patients

Téléphone 1-833-8-VYEPTI (893784) • Courriel support@vyeptitoday.ca • Télécopieur 1 833 9-VYEPTI (893784)

#### Indication et utilisation clinique :

- Vyepti<sup>MD</sup> (eptinezumab pour injection) est indiqué pour la prévention de la migraine chez l'adulte ayant au moins 4 jours avec migraine par mois. Vyepti<sup>MD</sup> doit être prescrit par un professionnel de la santé ayant de l'expérience dans le diagnostic et le traitement de la migraine.
- En l'absence de données recueillies chez les moins de 18 ans, l'utilisation de Vyepti<sup>MD</sup> n'est pas autorisée chez les enfants.
- L'innocuité et l'efficacité de Vyepti<sup>MD</sup> n'ont pas été établies chez les patients de 65 ans ou plus. Le programme de recherche clinique sur Vyepti<sup>MD</sup> ne regroupait pas suffisamment de patients de 65 ans ou plus pour nous permettre de déterminer si la réponse de ces patients différerait de celle des patients plus jeunes.

#### Mises en garde et précautions les plus importantes :

**Réactions d'hypersensibilité :** Des réactions d'hypersensibilité graves, notamment des cas d'œdème de Quincke, d'urticaire, d'éruption cutanée et de réaction anaphylactique, ont été signalées au sein de la classe des anti-CGRP, à laquelle appartient Vyepti<sup>MD</sup>. Ces réactions pourraient se manifester quelques minutes après le début de la perfusion. Advenant l'apparition d'une réaction d'hypersensibilité grave, il faut mettre fin immédiatement à la perfusion de Vyepti<sup>MD</sup> et instaurer le traitement approprié.

#### Autres mises en garde et précautions pertinentes :

- Patients atteints d'une maladie cardiovasculaire;
- Patients atteints de diabète ou d'obésité morbide;
- Patients présentant une intolérance héréditaire au fructose (IHF);
- Patients atteints d'insuffisance hépatique;
- Patients infectés par le VIH ou atteints d'hépatite B ou C;
- Patients atteints d'un trouble auto-immun;
- Patients atteints d'un trouble neurologique;
- Patients atteints d'insuffisance rénale;
- Fertilité;
- Femmes enceintes;
- Femmes allaitantes.

#### Pour de plus amples renseignements :

Consultez la monographie du produit à [https://www.lundbeck.com/content/dam/lundbeck-com/americas/canada/produits/files/vyepti\\_monographie\\_de\\_produit\\_francais.pdf](https://www.lundbeck.com/content/dam/lundbeck-com/americas/canada/produits/files/vyepti_monographie_de_produit_francais.pdf). Vous y trouverez des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui ne figurent pas dans le présent document. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en appelant au 1 800 586-2325.

**Références :** 1. Monographie de produit Vyepti<sup>MD</sup>. Saint-Laurent, QC : Lundbeck Canada Inc.  
2. Lipton RB *et al.* Efficacy and safety of eptinezumab in patients with chronic migraine: PROMISE-2. *Neurology*. 31 mars 2020;94(13):e1365-e1377.



© 2023 Lundbeck. Tous droits réservés.

Vyepti<sup>MD</sup> est une marque déposée de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.  
Vyepti AUJOURD'HUI<sup>MC</sup> est une marque de commerce de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.  
Vyepti AUJOURD'HUI<sup>MC</sup> [LOGO] est une marque de commerce de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.